

Date de mise en œuvre et lots supplémentaires
2006

Pourcentage du paquet couvert

Les mises en garde sanitaires sous forme de texte doivent impérativement couvrir 48 % de la face avant et les mises en garde sanitaires sous forme d'illustrations graphiques doivent impérativement couvrir 63 % du dos des paquets, y compris de la bordure. En tout, 56 % de la surface externe du paquet, y compris de la bordure, sont réservés aux mises en garde sanitaires.

Calendrier de rotation et historique

Quatorze mises en garde sanitaires sont utilisées sur les paquets de cigarettes.

Restrictions relatives aux informations trompeuses

L'utilisation de termes descriptifs trompeurs comme « légère » et « douce » est interdite sur les emballages.

Remarques particulières

La Belgique a été le premier pays de l'UE à adopter l'utilisation de mises en garde sanitaires.

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE

2006



Roken werkt zeer verslavend: begin er niet mee
Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas
Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!



Tabakrook bevat benzene, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide
La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène
Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure



Roken verouderd uw huid
Fumer provoque un vieillissement de la peau
Rauchen läßt Ihre Haut altern



Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken
Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer
Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben



Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie
Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoquer l'impotence
Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz



Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen
Protéger les enfants: ne leur faites pas respirer votre fumée
Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen



Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvalen en beroertes
Fumer provoque les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques d'apoplexie
Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfakte und Schlaganfälle



Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten
Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles
Wier das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen



Zoek hulp om te stoppen met roken: 0603 00 0000
Trouvez-vous aider pour arrêter de fumer: 0603 00 0000
Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: 0603 00 0000



Rokers sterven jonger
Les fumeurs meurent prématurément
Raucher sterben früher



Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood
Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse
Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen



Roken veroorzaakt dodelijke longkanker
Fumer provoque le cancer mortel du poumon
Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs



Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid
Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduire la fertilité
Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein



Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby
Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant
Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind