

**Дата внедрения и дополнительные раунды**  
2010

**Площадь размещения на упаковке**

С учетом рамки предупреждения должны занимать 43% лицевой и 53% оборотной стороны упаковки. В целом, предупреждения о вреде курения должны занимать 48% общей площади упаковки.

**График ротации и хронология**


Четырнадцать вариантов предупредительных надписей используются на сигаретных пачках.

**Ограничения в отношении информации, вводящей в заблуждение**

Не определены.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2010

 <p><b>Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!</b></p>	 <p><b>Tabakas dūmi satur benzolu, nitrozamīnus, formaldehīdu un zīrkābi</b></p>	 <p><b>Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam</b></p>	 <p><b>Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci</b></p>
 <p><b>Smēķēšana var izraisīt iēnu un mokošu nāvi</b></p>	 <p><b>Smēķētāji mirst jauni</b></p>	 <p><b>Smēķēšana izraisa neārstojamu plaušu vēzi</b></p>	 <p><b>Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!</b></p>
 <p><b>Smēķēšana paātrina ādas novecošanos</b></p>	<p><b>0803 00 00 00</b> <b>Izvēlieties brīvību,</b> <b>mēs jums palīdzēsim</b></p> <p><b>Lūdz palīdzību, lai atņemtu smēķēšanu</b></p>	<p><b>Jūs varat to izdarīt,</b> <b>mēs varam palīdzēt</b></p> <p><b>Pārtraukt smēķēšanu jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits</b></p>	<p><b>Koronārās sirds slimības risks samazinās par 50% pēc 1 gada atturēšanās no smēķēšanas</b></p> <p><b>Smēķēšanas atmešana samazina rībošu saslimt ar mirstošajām sirds un plaušu slimībām</b></p>
 <p><b>Smēķēšana var ātri veicināt neprostošanos un rada sirdslēkmes un insultu</b></p>	 <p><b>Smēķēšana var kaitēt spermatozoidiem un samazināt auglību</b></p>		