

Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке

Предупредительные надписи должны покрывать 33% лицевой и 33% оборотной сторон упаковок табачных изделий. В целом, предупреждения о вреде курения должны занимать 33% общей площади упаковки.

График ротации и хронология

Шесть вариантов предупредительных надписей используются на сигаретных пачках.

Ограничения в отношении информации, вводящей в заблуждение

Не определены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2010



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ҮР УДМЫГ ХӨНӨӨНӨ.
Цусан хангамж буурч хүчилтөрөгч, тэжээл дутагдсанаас ургийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ УРУУЛ, АМНЫ ХӨНДИЙН ХАВДАР, БУЙЛНЫ ӨВЧИН, ШҮДГҮЙДЭХ ШАЛТГААН БОЛНО.
Буйл үрэвсэж шүд сулран шүдгүйднэ.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭС ҮҮСГЭНЭ.
Цусны хүчилтөрөгчийн хангамж багассанаас эрхтнүүдэд тэжээл дутагдаж зүрх, тархины шигдээс үүсгэдэг.

Тамхичны зүрх Эрүүл зүрх



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЧИХРИЙН ШИЖИНГ ХҮНДРҮҮЛНЭ.
Захын болон төвийн судасны бөглөрлийг үүсгэж, хөл тайрах, хараагүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.



АНХААРУУЛГА
УУШГИНЫ ХАВДРЫН 90% НЬ ТАМХИНААС ҮҮДЭЛТЭЙ.
Уушгины хавдартай 10 хүн тутмын 9 нь тамхичин байдаг.

Тамхичны уушги Эрүүл уушги



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ БЭЛГИЙН СУЛРАЛ ҮҮСГЭНЭ.
Бэлэг эрхтний цусан хангамжийг бууруулдаг.